

任意予防接種



予防接種の種類	予防する病気	標準的な接種年齢	接種回数	ワクチンの種類	他の予防接種との間隔
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)	おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)	1歳以上	1回	生ワクチン	27日間以上
ロタウイルス	感染性胃腸炎	6週過ぎ～24週まで (ロタリック1価)	2回(1回目は14週6日までに接種) ※24週以降の接種はできない	生ワクチン(経口)	27日間以上
		6週過ぎ～32週まで (ロタテック5価)	3回(1回目は14週6日までに接種) ※32週以降の接種はできない		
B型肝炎	B型肝炎	<ul style="list-style-type: none"> ●一般的な感染予防 	計3回(4週間隔で2回、その後5～6ヶ月後に1回)	不活化ワクチン	6日間以上
		<ul style="list-style-type: none"> ●母子感染の予防※ 生後2カ月、3カ月、5カ月時			各1回(計3回)
インフルエンザ	インフルエンザ	6ヶ月すぎから13歳	毎年2回(1～4週間隔で)	不活化ワクチン	6日間以上
		13歳から64歳	毎年1回(2回の場合、1～4週間隔で)		6日間以上

町独自の事業として、インフルエンザは町民1000円の自己負担で接種できます！！