

予防接種一覧表 (定期予防接種と任意予防接種)

定期予防接種

予防接種の種類	予防する病気	法律の対象者	標準的な接種年齢	接種回数	ワクチンの種類	他の予防接種との間隔			
BCG 	結核	生後1年に至るまで	生後5ヶ月～8ヶ月未満	1回	生ワクチン	27日間以上			
四種混合 	ジフテリア・百日咳・破傷風・小児マヒ	生後3月から7.5歳に至るまで	生後3ヶ月～1歳まで	20日以上の間隔で3回	●ジフテリア・破傷風→トキソイド ●百日咳→不活化ワクチン ●不活化ワクチン	6日間以上			
			第1期初回	第1期初回接種の1年～1年6ヶ月後に追加接種		1回	6日間以上		
二種混合 	ジフテリア・破傷風	11歳以上13歳未満	11歳～12歳	1回	トキソイド	6日間以上			
MRワクチン(麻疹・風疹混合ワクチン)	麻疹・風疹	生後12ヶ月から24ヶ月に至るまで	生後12ヶ月～24ヶ月	1回	生ワクチン	27日間以上			
 麻疹(はしか) 風疹(三日ばしか)							第1期		
MRワクチン(麻疹・風疹混合ワクチン)	麻疹・風疹	5歳から7歳未満で小学校就学前1年間 (4/1～3/31)の者	5歳から7歳未満で小学校就学前1年間 (4/1～3/31)の者→いわゆる幼稚園の年長児	1回					
 麻疹(はしか) 風疹(三日ばしか)							第2期		
水ぼうそう(水痘)	水ぼうそう(水痘)	生後12ヶ月～生後36ヶ月に至るまで	1回目の接種は12ヶ月～15月に達する間に接種	2回	生ワクチン	27日間以上			
日本脳炎 ※ 	日本脳炎	生後6月から7.5歳に至るまで	3歳すぎ	6日以上の間隔で2回	不活化ワクチン	6日間以上			
				第1期初回		生後6月から7.5歳に至るまで	初回接種後6か月以上をあけて接種	1回	6日間以上
				第1期追加		9歳以上13歳未満	小学4年生	1回	6日間以上
 Hib(インフルエンザb菌:ヒブ)	インフルエンザb菌による感染	生後2ヶ月以上～5歳に至るまで (標準接種開始年齢: 生後2ヶ月～7ヶ月に至るまで)	標準スケジュール 計4回 【生後2ヶ月～7ヶ月に至るまで】 ・初回免疫: 生後12ヶ月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回 ・追加免疫: 初回免疫終了後、7～13か月までに接種 【生後7ヶ月～12ヶ月に至るまで】 ・初回免疫: 生後12ヶ月に至るまでの間に27日以上の間隔で2回 ・追加免疫: 初回免疫終了後、7か月以上の間隔をおいて接種 【生後1歳～5歳に至るまで】 1回接種	2回	不活化ワクチン	6日間以上			
							第1期追加		
 小児用肺炎球菌	肺炎球菌感染症	生後2ヶ月以上～5歳に至るまで (標準接種開始年齢: 生後2ヶ月～7ヶ月に至るまで)	標準スケジュール 計4回 【生後2ヶ月～7ヶ月に至るまで】 1回目⇒(27日以上あける)⇒2回目⇒(27日以上あける)⇒3回目⇒(60日以上あける)⇒追加接種 【生後7ヶ月～12ヶ月に至るまで】 1回目⇒(27日以上あける)⇒2回目⇒(60日以上あける)⇒追加接種 【1歳～2歳に至るまで】 1回目⇒(60日以上あける)⇒2回目 【2歳～5歳に至るまで】 1回のみ接種する。	2回	不活化ワクチン	6日間以上			
							第1期追加		
子宮頸がん予防ワクチン 	子宮頸がん	12歳～16歳に至るまで	中学1年生(13歳相当)の女子	サーバリックの場合: [初回⇒2回目(初回より1ヶ月後)⇒3回目(初回より5ヶ月後または、2回目から2.5か月以上)] ガーダシルの場合: [初回⇒2回目(初回より2ヶ月後)⇒3回目(初回より6か月後)]	不活化ワクチン	6日間以上			

予防接種の対象年齢とは・・・

お誕生日の前日までとなります。