

予防接種一覧表 (定期予防接種)

大切なお子さんを感染症から守るため、予防接種を受けましょう！



予防接種の種類 【生】生ワクチン 【不】不活化ワクチン	接種をお勧めする年齢 (標準的な接種期間と回数)	無料で受けられる年齢 (接種対象年齢)
B型肝炎 【不】	1回目：生後2か月 2回目：生後3か月 3回目：生後7か月～8か月	生後1歳未満
ロタウイルス感染症【生】	1価：生後2か月～生後14週6日の間に2回 5価：生後2か月～生後14週6日の間に3回	1価：生後6週～24週まで 5価：生後6週～32週まで
ヒブ感染症(細菌性髄膜炎等) 【不】	【生後2か月～7か月未満】 - 初回：27日以上の間隔で3回 - 追加：初回免疫終了後、7～13か月未満に1回 【生後7か月～12か月未満】 - 初回：生後12か月未満に2回 - 追加：初回免疫終了後、7～13か月未満に1回 【生後1歳～5歳未満】 1回	生後2か月～60か月(5歳)未満
※接種を開始する月齢によって、接種回数が異なります。		
小児肺炎球菌感染症【不】	【生後2か月～7か月未満】 - 初回：27日以上の間隔で3回(生後12か月までに完了) - 追加：初回免疫終了後、60日以上の間隔をあけて1回 【生後7か月～12か月未満】 - 初回：27日以上の間隔で2回(生後12か月までに完了) - 追加：初回2回終了後、60日以上の間隔をあけて1回 【生後1歳～5歳未満】 1回	生後2か月～60か月(5歳)未満
※接種を開始する月齢によって、接種回数が異なります。		
4種混合 【不】 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	第1期初回：生後2か月から12か月未満の間に3回 第1期追加：初回接種後概ね1年後に1回	生後2か月～90か月(7歳6か月)未満
2種混合 【不】 (ジフテリア・破傷風)	第2期：11歳以上12歳未満の間に1回	11歳以上13歳未満
BCG(結核) 【生】	生後5か月～8か月に達するまでの期間に1回	生後1歳未満
MRワクチン 【生】 (麻しん・風しん混合ワクチン)	第1期：生後12か月～24か月未満の間に1回	生後12か月～24か月未満
	第2期：5歳以上7歳未満で小学校就学前1年間の間に1回	小学校入学1年前の4月1日～入学の年の3月31日まで
水ぼうそう(水痘) 【生】	- 初回：生後12か月～15か月未満の間に1回 - 追加：初回接種終了後、6～12か月の間に1回	生後12か月～36か月未満
日本脳炎【不】	第1期初回：3歳中の間に2回	生後3か月～90か月(7歳6か月)未満
	第1期追加：初回接種後概ね1年後に1回	
	第2期：9歳中に1回	9歳以上13歳未満
	※接種の機会を逃した方 平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれで20歳未満	未接種分を接種
子宮頸がん予防ワクチン 【不】	中学1年生(13歳相当)の間に3回	小学6年生～高校1年相当の女子

任意予防接種について

定期予防接種に含まれない任意の予防接種(おたふくかぜ等)については直接、医療機関へご相談ください。

季節性インフルエンザは、町が費用助成を行っています。ご不明な点は子育て支援係までご連絡ください。

