

# 予防接種一覧表 (定期予防接種)

大切なお子さんを感染症から守るため、予防接種を受けましょう!



予防接種名	種類	接種をお勧めする年齢 (標準的な接種期間と回数)	無料で受けられる年齢 (接種対象年齢)
B型肝炎	不活化ワクチン	1回目：生後2か月 2回目：生後3か月 3回目：生後7か月～8か月	生後1歳未満
ロタウイルス感染症	生ワクチン	1価：生後2か月～生後14週6日の間に2回 5価：生後2か月～生後14週6日の間に3回	1価：生後6週～24週まで 5価：生後6週～32週まで
ヒブ感染症(細菌性髄膜炎等)	不活化ワクチン	【生後2か月～7か月未満】 ・初回：27日以上の間隔で3回 ・追加：初回免疫終了後、7～13か月未満に1回 【生後7か月～12か月未満】 ・初回：生後12か月未満に2回 ・追加：初回免疫終了後、7～13か月未満に1回 【生後1歳～5歳未満】 1回	生後2か月～60か月(5歳)未満
※接種を開始する月齢によって、接種回数が異なります。			
小児肺炎球菌感染症	不活化ワクチン	【生後2か月～7か月未満】 ・初回：27日以上の間隔で3回(生後12か月までに完了) ・追加：初回免疫終了後、60日以上の間隔をあけて1回 【生後7か月～12か月未満】 ・初回：27日以上の間隔で2回(生後12か月までに完了) ・追加：初回2回終了後、60日以上の間隔をあけて1回 【生後1歳～5歳未満】 1回	生後2か月～60か月(5歳)未満
※接種を開始する月齢によって、接種回数が異なります。			
4種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ混合)	不活化ワクチン	第1期初回：生後2か月から12か月未満の間に3回 第1期追加：初回接種後概ね1年後に1回	生後2か月～90か月(7歳6か月)未満
5種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ、ヒブ混合)	不活化ワクチン	第1期初回：生後2か月から12か月未満の間に3回 第1期追加：初回接種後概ね1年後に1回	生後2か月～90か月(7歳6か月)未満
2種混合 (ジフテリア・破傷風)	不活化ワクチン	第2期：11歳以上12歳未満の間に1回	11歳以上13歳未満
BCG(結核)	生ワクチン	生後5か月～8か月に達するまでの期間に1回	生後5か月～8か月に達するまでの期間に1回
MRワクチン(麻しん・風しん混合ワクチン)	生ワクチン	第1期：生後12か月～24か月未満の間に1回 第2期：5歳以上7歳未満で小学校就学前1年間の間に1回	生後12か月～24か月未満 小学校入学1年前の4月1日～入学の年の3月31日まで
水ぼうそう(水痘)	生ワクチン	・初回：生後12か月～15か月未満の間に1回 ・追加：初回接種終了後、6～12か月の間に1回	生後12か月～36か月未満
日本脳炎	不活化ワクチン	第1期初回：3歳中の間に2回 第1期追加：初回接種後概ね1年後に1回 第2期：9歳中に1回	生後3か月～90か月(7歳6か月)未満 9歳以上13歳未満
※接種の機会を逃した方 平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれで20歳未満			未接種分を接種
子宮頸がん予防ワクチン	不活化ワクチン	中学1年生(13歳相当)の間に3回	小学6年生～高校1年相当の女子

## 任意予防接種について

定期予防接種に含まれない任意の予防接種(おたふくかぜ等)については直接、医療機関へご相談ください。



季節性インフルエンザは、町が費用助成を行っています。ご不明な点は子育て支援係までご連絡ください。